

LA PRESCRIZIONE- PROPOSTA IN MEDICINA GENERALE

allegati

| | |
|---|--------------|
| Deliberazione della giunta regionale n. 69 del 26/01/2009 Decalogo per la semplificazione dei percorsi assistenziali | <i>p. 2</i> |
| Codifica delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa (ticket) | <i>p. 3</i> |
| Fattori di rischio per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea | <i>p. 7</i> |
| Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità | <i>p. 8</i> |
| Assistenza termale | <i>p. 13</i> |
| "Note" della Agenzia Italiana del Farmaco limitative della prescrivibilità | <i>p. 15</i> |
| Raggruppamenti di Attesa Omogenei (R.A.O.) per accertamenti e consulenze | <i>p. 26</i> |



Terni, marzo 2019

A cura di **Maurizio Verducci** - medico di medicina generale
Animatore di Formazione della Società Italiana di Medicina Generale
Docente e Coordinatore delle Attività Pratiche nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Umbria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 26/01/2009

Nota di indirizzo alle Aziende Sanitarie Regionali sull'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e la semplificazione dei percorsi assistenziali.

DECALOGO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI

- 1) Il Medico specialista, a conclusione di una visita, qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti (accertamenti diagnostici, visite di approfondimento), prescrive direttamente le prestazioni sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tale adempimento oltre a consentire il completamento dell'iter diagnostico evita all'assistito di doversi recare dal Medico di Famiglia (MMG o PLS) per la semplice trascrizione. Al termine del completamento diagnostico lo specialista provvede a comunicare le sue conclusioni al paziente ed al Medico di Famiglia.
- 2) Il Medico Specialista, all'atto della dimissione ospedaliera, prescrive ovvero provvede ad attivare le prenotazioni per le ulteriori indagini necessarie al completamento dell'iter diagnostico-terapeutico. In caso di visite e/o accertamenti utili al primo monitoraggio del paziente dopo la dimissione prescrive direttamente le prestazioni sul ricettario SSN. Tale adempimento permette all'assistito di accedere rapidamente alla prenotazione delle prestazioni ed evita l'ulteriore ricorso al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la semplice trascrizione.
- 3) Il Medico Specialista a conclusione di una visita ambulatoriale o all'atto della dimissione, provvede, qualora l'assistito non ne sia già in possesso e ne abbia diritto secondo le norme, a fornire la documentazione per l'esenzione ticket per patologia. Il rilascio dell'esenzione avviene a cura degli sportelli della ASL. Il cittadino potrà così recarsi dal Medico di Famiglia (MMG o PLS) con il tesserino di esenzione già rilasciato.
- 4) La struttura ospedaliera all'atto della dimissione garantisce all'assistito la fornitura di farmaci in modo da potersi recare in tempi successivi, senza disagi, dal proprio Medico di Famiglia, per la continuazione della cura.
- 5) Il Medico di Pronto Soccorso e/o lo Specialista, provvede al rilascio o alla prescrizione diretta a favore dell'assistito, sul ricettario SSN, solo dei farmaci ritenuti necessari in relazione alla situazione clinica. Per la prescrizione di farmaci, la cui somministrazione può essere differita, i pazienti devono essere invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante.
- 6) Le strutture ospedaliere regionali, in accordo con le norme vigenti, devono fornire tutti i presidi sanitari necessari all'assistito durante la degenza. In particolare, per i farmaci da utilizzare nel corso del ricovero, non può essere richiesta alcuna prescrizione al Medico di Famiglia.
- 7) Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta sulla richiesta di prestazioni specialistiche (prime visite, indagini diagnostiche) deve riportare il quesito diagnostico. Tale indicazione favorisce gli Specialisti alla interpretazione delle indagini, migliorando l'assistenza.
- 8) L'indicazione della "urgenza" o della "urgenza breve o differibile" o delle "classi di priorità RAO" (ove previste) sulle richieste di visite e/o accertamenti sanitari, da parte dei Medici o Pediatri di Famiglia, deve tenere conto esclusivamente di valutazioni cliniche compiute dal Medico Curante che se ne assume la responsabilità. Tale indicazione non deve essere utilizzata per la soluzione di problemi di carattere amministrativo e/o organizzativo.
- 9) Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera scelta è tenuto ad allegare alle proprie richieste di ricovero ordinario (e a quelle urgenti quando possibile e/o quando richiesto), la "scheda di accesso in Ospedale" sulla quale riportare le informazioni più adeguate per facilitare l'assistenza al cittadino da parte dei Medici ospedalieri.
- 10) Tutti i Medici sono tenuti alla massima leggibilità dei referti, delle cartelle, delle lettere di dimissione e di ogni altra documentazione sanitaria utilizzando mezzi di scrittura o attenendosi ad una grafia inequivocabile. Ogni documento deve riportare: recapito della struttura, firma e timbro del Medico. Nei suggerimenti terapeutici deve essere indicato il principio attivo o la classe terapeutica e deve essere posta ogni cura nel rispetto puntuale delle indicazioni d'uso dei farmaci e delle note AIFA.

CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA - Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2008 – Allegato 12

Istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione

Il medico prescrittore dovrà riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate.

Salvo alcuni casi particolari, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere numerico a due cifre.

I casi particolari sono:

- esenzioni per patologie croniche (n. 1): il codice è costituito dallo 0 (zero) e il sub-codice, per le condizioni indicate nella nota (1) è costituito da 4 caratteri;
- esenzioni per patologie rare (n. 2): il sub-codice è costituito da 5 caratteri
- le codifiche regionali si compongono di 6 caratteri: il codice è costituito da 3 caratteri alfabetici e il sub-codice da 3 caratteri numerici.

Tabella 1 - ESENZIONI CORRELATE ALLO STATO DI SALUTE (a cura del medico prescrittore)

| n. | Tipologia di esenzione | Cod. | SubCod. | Note |
|----|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296); | 0 malattie croniche | da 01 a 67 | Vedi Nota (1) |
| 2 | Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279; | R Rare | da Aannn a Qannn | Vedi Nota (2) |
| 3 | Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279). | | 99 | Vedi Nota (3) |
| 4 | Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 ^a alla 5 ^a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991); | G Guerra | 01 | |
| 5 | Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991); | | 02 | |
| 6 | Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991); | L Lavoro | 01 | |
| 7 | Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991); | | 02 | |
| 8 | Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991); | | 03 | |
| 9 | Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991); | | 04 | |
| 10 | Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 ^a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); | S Servizio | 01 | |
| 11 | Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 ^a alla 5 ^a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); | | 02 | |
| 12 | Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991); | | 03 | |
| 13 | Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230) | | 04 | |

| | | | | |
|--------|--|------------------------------|------------|---|
| 14 | Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); | C Civili | 01 | |
| 15 | Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); | | 02 | |
| 16 | Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); | | 03 | |
| 17 | Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); | | 04 | |
| 18 | Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); | | 05 | |
| 19 | Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); | | 06 | |
| 19bis | Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod. | | 07 | |
| 20 | Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998); | N Legge n. 210 | 01 | |
| 21 | Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 302/90 - vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7 luglio 2006, n. 243) | V Vittime | 01 | |
| 21bis | Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità >80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206) | | 02 | |
| 22 | Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca pre-concezionale; | M Maternità | 00 | |
| 23 | esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; oppure → | | da 01 a 41 | così composto: M + nn (settimana di gravidanza) |
| 24 | Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria | | 99 | Vedi Nota (4) |
| 25 | Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio; | | 50 | |
| 25bis | Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante | | 52 | |
| 26 | Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998); | D Diagnosi precoce | 01 | |
| 27 | Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico; | | 02 | |
| 28 | Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico; | | 03 | |
| 29 | Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto; | | 04 | |
| 30 | Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) | | 05 | |
| 30 bis | Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 220 ottobre 2002) | | 06 | sostituisce il codice regionale PMU002 |
| 31 | Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998); | T donazione | 01 | |
| 32 | Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte); | B Hiv | 01 | |
| 33 | Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -); | P Prevenzione | 01 | |
| 34 | Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -); | | 02 | |
| 35 | Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -); profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465 | | 03 | |

| | | | | |
|----|--|------------------------------------|----|---------------|
| 36 | Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230) | F detenuti | 01 | |
| 37 | Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) | I Idoneità | 01 | |
| 38 | Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN | PML | | Vedi nota (5) |
| 39 | Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394. | X Extracomunitari | 01 | Vedi nota (6) |
| 40 | Terapia del dolore severo | TDL | 01 | Vedi nota (7) |

Note

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le "Afezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo"

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

Nota (5)

Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio medico-legale, sono:

- visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide;
- visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;
- visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
- visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^a e 2^a classe in costanza di rapporto di lavoro nel settore dell'aviazione civile);
- accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;
- accertamenti diagnostici richiesti dall'I.M.L. in sede di visita straordinaria;

visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all' I.P.Se.Ma.);
emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.

Nota (6)

Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

Nota (7)

Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.

Tabella 2 - ESENZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

| | | | |
|--|--------------------------------------|----|--|
| Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); | E condizioni Economiche | 01 | |
| Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); | | 02 | |
| Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); | | 03 | |
| Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); | | 04 | |

CODIFICA REGIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

| | | | | |
|---|--|------------|-----|--|
| 1 | Sterilità | P01 | 095 | |
| 2 | Contracezione | P01 | 096 | |
| 3 | Richiesta di asilo politico e umanitario (Circolare n. 5, 24 marzo 2000 del Ministero della sanità, DGR n. 482 del 16 maggio 2001) | APU | 001 | |
| 4 | Liberazione del Tunnel Carpale e prestazioni specialistiche correlate - DGR 179 del 3 marzo 2004 | TCU | 003 | |
| 5 | Intervento di Cataratta e prestazioni specialistiche correlate - DGR 179 del 3 marzo 2004 | ICU | 004 | |

FATTORI DI RISCHIO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DENSITOMETRIA OSSEA
(All. 4A DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza")

L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno dei seguenti

Fattori di rischio maggiori:

1. per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile
 - a. precedenti fratture da fragilità (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali
 - b. riscontro radiologico di osteoporosi
 - c. terapie croniche (attuata o prevista)
 - corticosteroidi sistemici (per più di tre mesi a posologie ≥ 5 mg/die di equivalente prednisonico)
 - levotiroxina (a dosi soppressive)
 - antiepilettici
 - anticoagulanti (eparina)
 - immunosoppressori
 - antiretrovirali
 - sali di litio
 - agonisti del GnRH
 - chemioterapia o radioterapia in età pediatrica (in età adulta solo se associate a tre o più criteri minori)
 - d. patologie a rischio di osteoporosi:
 - malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1)
 - rachitismi/osteomalacia
 - sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate
 - celiachia e sindromi da malassorbimento
 - malattie infiammatorie intestinali croniche severe
 - epatopatie croniche colestatiche
 - fibrosi cistica
 - insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica
 - emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, talassemia, drepanocitosi, mastocitosi)
 - artrite reumatoide (incluso morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche
 - patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico
 - trapianto d'organo;
 - allettamento e immobilizzazioni prolungate (>3 mesi)
 - paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale
2. limitatamente a *donne in menopausa*:
 - a. anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni
 - b. menopausa prima di 45 anni
 - c. magrezza: indice di massa corporea $< 19\text{Kg/m}^2$

L'indagine densitometrica è, inoltre, indicata in presenza di:

- 3 o più fattori di rischio minori per le *donne in menopausa*:

1. età superiore a 65 anni
2. anamnesi familiare per severa osteoporosi
3. periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale
4. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mg/die)
5. fumo > 20 sigarette/die
6. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool)

- 3 o più fattori di rischio minori per le *uomini di età superiore a 60 anni*:

1. anamnesi familiare per severa osteoporosi
2. magrezza: indice di massa corporea $< 19\text{Kg/m}^2$
3. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mg/die)
4. fumo > 20 sigarette/die
5. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool)



ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E A TUTELA DELLA MATERNITÀ

Art. 59 DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”

1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art.1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture.

2. La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B.

3. In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10A, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte dallo specialista.

4. Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10B, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina generale.

5. Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato 10C, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno.

6. In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.

7. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.

8. Qualora dalle visite ostetrico-ginecologiche periodiche, durante la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche.

9. Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è abrogato.

ALLEGATO 10A

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE

1. Prestazioni specialistiche per la donna

89.26.1 PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale o preconcezionale. Non associabile a 89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA

90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]

91.26.D VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie

91.26.E VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

90.66.7 Hb - EMOGLOBINE. Dosaggio frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale)

91.38.5 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test convenzionale] (Se non effettuato nei tre anni precedenti nella fascia d'età dello screening >25 anni)

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

2. Prestazioni specialistiche per l'uomo *In caso di donna (partner) eterozigote per emoglobinopatie*

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

90.66.7 Hb - EMOGLOBINE. Dosaggio frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale).

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

3. Prestazioni specialistiche per la coppia

91.23.7 VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2]. TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24. Incluso: eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS.

90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D)

91.10.B TREPONEMA PALLIDUM. Sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] più VDRL [RPR]. Incluso: eventuale titolazione. Incluso: eventuale Immunoblotting.

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

4. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico:

Alla coppia

89.7B.1 PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA. Visita specialistica genetica con esame obiettivo e valutazione della documentazione clinica recente e remota. Incluso: primo colloquio, anamnesi personale e familiare, costruzione di un albero genealogico familiare nei rami paterno e materno per almeno 3 generazioni. Consultazione della letteratura scientifica e di database di genetica clinica specifici. Formulazione dell'ipotesi diagnostica. Scelta del test genetico appropriato. Spiegazione vantaggi e limiti del test genetico e somministrazione consensi informati. Scrittura della relazione. Escluso: Visita multidisciplinare 89.07

G2.01 ANALISI CITOGENETICA POSTNATALE. Analisi del cariotipo. Incluso: coltura di linfociti con mitogeni, colorazioni differenziali ed eventuale analisi per mosaicismo

88.78.2 ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale (*Lo standard tecnico è rappresentato dalle sonde endovaginali ad alta frequenza (≥5 MHz). La via transaddominale è limitata ai fini integrativi o in caso di impossibilità di accesso per via vaginale*). Incluso: eventuale Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1

68.12.1 ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CON O SENZA BIOPSIA DELL'ENDOMETRIO

68.16.1 BIOPSIA ENDOMETRIALE Non associabile a 68.12.1

90.46.5 LUPUS ANTICOAGULANT (LAC)

90.47.5 ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA [IgG, IgM ed eventuali IgA]

90.51.4 ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) Non prescrivibile in caso di positività già accertata

90.51.5 ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)

90.54.4 ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

ALLEGATO 10B

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLÓGICA ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

All'inizio della gravidanza, possibilmente nel **PRIMO TRIMESTRE** (entro 13 settimane+6 gg.), e comunque al primo controllo:

89.26.3 PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.1

PRIMA VISITA GINECOLOGICA

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

90.66.7 Hb - EMOGLOBINE. Dosaggio frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale) **Qualora non eseguito in funzione preconcezionale.**

90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D) **Qualora non eseguito in funzione preconcezionale**

90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] **Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane**

90.27.1 GLUCOSIO⁽³⁾

91.26.D VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie **Da ripetere entro la 17^a settimana in caso di negatività**

91.26.E VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG per controllo stato immunitario **Da ripetere entro la 17^a settimana in caso di negatività**

91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività**

91.10.B TREPONEMA PALLIDUM. Sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] più VDRL [RPR]. Incluso eventuale titolazione. Incluso: eventuale Immunoblotting.

91.23.F VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2] .TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24. Incluso: eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS. **Qualora non eseguito nei tre mesi precedenti**

90.44.3 URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario

90.94.2 ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma

90.88.J CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM. Incluso IgA se IgM negative **In caso di fattori di rischio riconosciuti**⁽³⁾

91.03.5 NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI VARI ESAME COLTURALE. Se positivo, incluso identificazione ed eventuale antibiogramma **In caso di fattori di rischio riconosciuti**⁽³⁾

91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI. Incluso eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS. **In caso di fattori di rischio riconosciuti**⁽³⁾

91.20.2 VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA. Incluso, estrazione, retrotrascrizione, amplificazione, ibridazione inversa o sequenziamento **Solo in caso di HCV positivo**

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA **Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale**

90.17.6 HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A. Da eseguire solo in associazione con 88.78.4 "ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA TRASLUCENZA NUCALE. Incluso: consulenza pre e post test combinato (1° trimestre)

88.78.4 ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA TRASLUCENZA NUCALE. Incluso: consulenza pre e post test combinato. **Da eseguire esclusivamente tra 11 settimane + 0 gg e 13 settimane +6 gg**

91.38.5 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test convenzionale] **Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening**

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

Nel **SECONDO TRIMESTRE:**

da 14 settimane + 0gg. a 18 settimane + 6gg. :

90.17.8 TRI TEST PER AFP, HCG TOTALE O FRAZIONE LIBERA, E3. DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER ANOMALIE CROMOSOMICHE E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (2° trimestre)

90.26.5 GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico (da 2 a 4 determinazioni). Inclusa Determinazione del Glucosio basale 90.27.1 **Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio**⁽³⁾

91.26.D VIRUS ROSOLIA IgG e IgM per sospetta infezione acuta. Incluso: Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie

91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **In caso di sieronegatività**

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

da 19 settimane + 0gg a 23 settimane + 6gg :

91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **In caso di sieronegatività**

88.78.3 ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Non associabile a 88.75.1

ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Non associabile a 88.78 **da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0**

da 24 settimane + 0gg a 27 settimane + 6gg

91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **In caso di sieronegatività**

90.26.5 GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico (da 2 a 4 determinazioni). Inclusa Determinazione del Glucosio basale 90.27.1 (1) **Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio**⁽³⁾

90.44.3 URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario

90.94.2 ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma **In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria**

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

Nel **TERZO TRIMESTRE:**

da 28 settimane + Oggi. a 32 settimane + 6gg.:

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico
90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]
91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **In caso di sieronegatività**
88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA. **Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna**
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

da 33 settimane + 0 gg. a 37 settimane + 6gg.:

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico
91.09.D TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie. Incluso eventuali IgA e Immunoblotting **In caso di sieronegatività**
91.18.6 VIRUS HBV [HBV] REFLEX. ANTIGENE HBsAg + ANTICORPI anti HBsAg + ANTICORPI anti HBcAg. Incluso ANTICORPI anti HBcAg IgM se HBsAg e anti HBcAg positivi. Incluso ANTIGENE HBeAg se HBsAg positivo. Incluso ANTICORPI anti HBeAg se HBeAg negativo
91.10.B TREPONEMA PALLIDUM. Sierologia della sifilide. Anticorpi EIA/CLIA e/o TPHA [TPPA] più VDRL [RPR] incluso eventuale titolazione. Incluso eventuale Immunoblotting.
91.23.F VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2] .TEST COMBINATO ANTICORPI E ANTIGENE P24 incluso eventuale Immunoblotting. Non associabile a 91.13.2 Virus Anticorpi Immunoblotting (Saggio di conferma) NAS.
90.44.3 URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario⁽³⁾
90.94.2 ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]. Ricerca batteri e lieviti patogeni. Incluso conta batterica. Se positivo, incluso identificazione e antibiogramma **in caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria**
91.08.4 STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO GRUPPO B **Raccomandato a 36-37 settimane**
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

da 41 settimane + Oggi.:

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA **per valutazione quantitativa del liquido amniotico**
75.34.1 CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA

Per le donne che si presentano dopo la 13° settimana sono escluse dalla partecipazione al costo sia le prestazioni specialistiche relative alle precedenti fasi di gravidanza, quando appropriate, sia quelle relative alla settimana di gravidanza in corso.

⁽³⁾ secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011

ALLEGATO 10C

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIAGNOSI PRENATALE INVASIVA, IN ESCLUSIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO

L'accesso alla diagnosi prenatale ha due principali gruppi di indicazione, che riguardano situazioni nelle quali il rischio di patologia fetale è aumentato al di sopra dei livelli medi della popolazione generale:

- 1) Rischio procreativo prevedibile a priori in quanto correlato ad una condizione biologica genetica presente in uno o in entrambi i genitori o nella famiglia, da valutare in sede di consulenza genetica
- 2) Rischio rilevato in corso di gravidanza: difetti fetali evidenziati mediante ecografia alterazione di parametri biochimici/molecolari rilevati con sistemi validati ed erogati presso strutture appositamente individuate dalle regioni, predittivi di patologie fetali e/o cromosomiche/geniche, patologie infettive a rischio fetale.

Le condizioni per le quali è previsto l'accesso alla diagnosi prenatale invasiva sono:

1) Per le indagini citogenetiche:

- probabilità di trisomia 21, o di altre anomalie cromosomiche $\geq 1/300$ al momento del test per la valutazione del rischio nel primo trimestre (o $\geq 1/250$ in caso di test nel secondo trimestre) calcolata secondo i metodi indicati dalle Regioni tra quelli basati sulla età materna in combinazione con altri parametri ecografici fetali e/o di laboratorio. Tale calcolo dovrà essere effettuato utilizzando specifici protocolli nell'ambito di programmi che garantiscano uniformità di accesso in tutto il territorio regionale, in Centri individuati dalle singole regioni e sottoposti a verifica continua della qualità. L'opzione da parte delle Regioni deve essere orientata all'adozione di metodi di calcolo del rischio con una maggiore

sensibilità diagnostica e un minor numero di falsi positivi tenuto conto dell'evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica.

- genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale bilanciato dei cromosomi
- genitore con aneuploidia cromosomica omogenea o in mosaico
- anomalie fetali/della gravidanza evidenziate mediante ecografia

2) Per le indagini genetiche:

- genitore eterozigote per una patologia/mutazione autosomica dominante,
- genitori entrambi eterozigoti per mutazioni geniche correlate a patologie autosomi che recessive,
- madre eterozigote per mutazioni recessive legate all'X,
- madre portatrice di mutazione mitocondriale;
- segni ecografici feto-annessiali indicativi di specifiche patologie geniche
- altre condizioni di possibile rischio correlate alla storia familiare, da verificare in sede di consulenza genetica.

3) Per le indagini infettivologiche:

- condizione di rischio fetale determinato sulla base di una accertata infezione materna e/o di segni rilevati all'ecografia potenzialmente associati a patologie infettive.



ASSISTENZA TERMALE

Art. 20 DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.

2. L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

ALLEGATO 9

Aventi diritto:

Hanno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale gli assistiti affetti dalle seguenti patologie:

1. Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari;
2. Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinuzitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico);
3. Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative), dermatite seborroica ricorrente;
4. Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche;
5. Malattie O.R.L.: rinopatia vasomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;
6. Malattie dell'apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
7. Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico;
8. Malattie dell'apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Prestazioni

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di “Annettamento”) per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica - Esame audiometrico - 12 insufflazioni endotimpaniche - 12 cure inalatorie
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica - 12 ventilazioni polmonari medicate e non - 12 aerosol - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. “Fanghi epatici”) comprendente:
 - Visita specialistica - 6 fanghi epatici - 6 bagni carbogassosi - 12 cure idropiniche
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica – Elettrocardiogramma - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) - 12 bagni “terapeutici” con idromassaggio

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:

- Visita specialistica - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)

17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica) - Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie) - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie) - Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; etc) - Altre terapie strumentali e medicamentose (qualora richieste dai singoli casi)

18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica) - Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari) - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari - Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non – ossigenoterapia - cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento")
per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni - Aerosol o docce nasali - Irrigazioni vaginali

20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni - Aerosol o docce nasali - Irrigazioni vaginali

21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni - Aerosol o docce nasali - Irrigazioni vaginali

22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto

delle seguenti prestazioni:

- Inalazioni - Aerosol o docce nasali - Irrigazioni vaginali


23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche comprendente:

A. Prestazioni idrotermali fondamentali:

- 12 inalazioni - 12 aerosol - 12 nebulizzazioni o polverizzazioni

B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali - Ventilazioni polmonari - Irrigazioni vaginali



NOTE AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.07 - Suppl. Ord. n. 6 – e successive modificazioni)

Sintesi a cura di Maurizio Verducci

Ad ogni nota l'Agenzia Italiana del Farmaco allega dei chiarimenti sulle motivazioni della limitazione con la relativa bibliografia (<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/note-aifa>).

Di seguito è riportato l'elenco delle note con la descrizione sintetica. I numeri mancanti erano assegnati a note poi abolite.

N.B. Nonostante l'attenzione posta nel compilare l'elenco non si può escludere completamente la presenza di errori od omissioni.

Nota 1 - La prescrizione a carico del SSN è limitata:

alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore

- in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei
- in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi

purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio

- storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante
- concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici
- età avanzata

Pantoprazolo, omeprazolo, misoprostolo, lansoprazolo, esomeprazolo, misoprostolo+diclofenac (assoggettata anche alla nota 66)

Nota 2 - La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- cirrosi biliare primitiva;
- colangite sclerosante primitiva;
- colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare;
- calcolosi colesterinica.

Acidi biliari: ursodesossicolico, tauroursodesossicolico, chenoursodesossicolico

Nota 4 - La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale:

- nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes zoster
- neuropatia associata a malattia neoplastica
- dolore post-ictus o da lesione midollare
- polineuropatie, multilineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace.

gabapentin, pregabalin

- neuropatia diabetica

duloxetina, gabapentin, pregabalin

L'impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin.

Al momento non sono disponibili evidenze o analogie fisiopatologiche che giustificano la rimborsabilità dei farmaci in nota per le radicolopatie da compressione.

Il Tavolo Neurologico dell'AIFA ha indicato i seguenti criteri diagnostici limitatamente alle indicazioni:

- Sclerosi Multipla: diagnosi secondo i criteri internazionali.



- Dolore post-ictus: dato anamnestico di ictus cerebri. Il dolore deve essere nel territorio del difetto sensitivo prodotto dall'ictus.
- Polineuropatie e poliradicoloneuropatie: esame obiettivo che documenti un difetto della sensibilità, l'abolizione/riduzione dei riflessi profondi ± difetto di forza elementare con distribuzione simmetrica, distale agli arti. La diagnosi deve essere confermata da un esame elettroencefalografico. La diagnosi eziologica è fondata sui dati di laboratorio.
- Nevralgie iatrogene: dato anamnestico di lesione chirurgica e dolore a carattere nevralgico nel territorio corrispondente.
- Nevralgie post-radioterapia: dato anamnestico di radioterapia, distribuzione di difetto sensitivo o sensitivo-motorio e dolore neuropatico nel territorio corrispondente.
- Nevralgie da compressione/infiltrazione tumorale: dato anamnestico di tumore, evidenza radiologica o ecografica di lesione tumorale e difetto sensitivo o sensitivo-motorio nel territorio nervoso corrispondente.
- Neuropatie da intrappolamento: difetto sensitivo o difetto sensitivo motorio nel territorio di un nervo periferico. La diagnosi deve essere confermata da un esame elettroencefalografico.
- Lesioni midollari: esame obiettivo che documenti alterazioni sensitive e/o motorie compatibili con danno midollare focale (mielopatie da compressione, post-ischemiche, siringomielia) o danno midollare diffuso (mielopatia da HIV, da malattia degenerativa). La diagnosi deve essere confermata da una risonanza magnetica.

Nota 8 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

- carenza primaria di carnitina
- carenza di carnitina secondaria a trattamento dialitico

Levocarnitina

Nota 11 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico;

Acido folinico e suoi analoghi

Nota 12 – La nota è abolita e la prescrizione di eritropoietine a carico del SSN è vincolata all'adozione del Piano Terapeutico AIFA redatto su specifico modulo da strutture specialistiche in una delle seguenti condizioni:

- trattamento dell'anemia ($Hb < 11$ g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e in soggetti pediatrici sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo;

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta, darbepoietina alfa, eritropoietina zeta (per darbepoietina sono disponibili dati in età pediatrica solo per età >11 anni)

- trattamento dell'anemia ($Hb < 11$ g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti

Metossipolietilenglicole-eritropoietina beta, eritropoietina teta

- trattamento dell'anemia ($Hb < 10$ g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di $Hb < 8$ g/dL è indicato il ricorso all'emotrasfusione;

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta, darbepoietina alfa, eritropoietina teta e zeta

- trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta, eritropoietina zeta

Nota 13 (ultima modifica G.U. n. 89 del 9 aprile 2013 e G.U. n. 156 data 8 luglio 2014)

Per il testo completo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-13>

Farmaci ipolipemizzanti

Fibrati: bezafibrato fenofibrato, gemfibrozil

Statine: simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina

Altri: omega polienoici (PUFA-N3), ezetimibe

Premessa

Il calcolo del rischio cardiovascolare secondo le carte va effettuato solo per i pazienti senza evidenza di malattia. Sono considerati per definizione a rischio ALTO (e il loro target terapeutico è pertanto un valore di colesterolo LDL < 100), oltre a coloro che presentano un risk score ≥ 5 e < 10 per CVD fatale a 10 anni, i pazienti con dislipidemie familiari, quelli con ipertensione severa, i pazienti diabetici senza fattori di rischio CV e senza danno d'organo, i pazienti con insufficienza renale cronica moderata (FG 30-59 ml/min/1,73 m²). Sono invece considerati a rischio MOLTO ALTO (e pertanto con target terapeutico di colesterolo LDL < 70), oltre ai soggetti con uno score ≥ 10 , i pazienti con malattia coronarica, stroke ischemico, arteriopatie periferiche, pregresso infarto, bypass aorto-coronarico, i pazienti diabetici con uno o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo (come la microalbuminuria) e i pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min/1,73 m²).

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- **Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi^o, e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati al relativo paragrafo**

| Classificazione dei pazienti | Target terapeutico (Colesterolo LDL in mg/dl) | Farmaci prescrivibili a carico del SSN in funzione del raggiungimento del target terapeutico | |
|--|---|--|---|
| Categorie di rischio ^(*) | | Trattamento di 1° livello | Trattamento di 2° livello |
| Pazienti con rischio medio score 2-3% | Colesterolo LDL < 130 | Modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina ^(**) |
| Pazienti con rischio moderato score 4-5% | Colesterolo LDL < 115 | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina ^(**) | |
| Pazienti con rischio alto score >5% <10% | Colesterolo LDL < 100 | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina ^(**) (preferibilmente atorvastatina se necessaria riduzione LDL > 50%) | Rosuvastatina, ezetimibe + statine (in associazione estemporanea o preconstituata) ^(**) |
| Pazienti con rischio molto alto score $\geq 10\%$ | Colesterolo LDL < 70 (riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL) | Atorvastatina [§] , pravastatina, fluvastatina, lovastatina, simvastatina ^(**) [§] Rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia con altre statine | Ezetimibe + statine (in associazione estemporanea o preconstituata) ^(**) |
| Particolari categorie di pazienti | | | |
| Pazienti in trattamento con statine con HDL basse (<40 mg nei M e 50 nelle F) e/o trigliceridi elevati (>200 mg/dl) | | Fibrati [^] | |

^(o) La terapia dovrebbe essere intrapresa contemporaneamente alla modifica dello stile di vita nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL >70 mg/dl ed in quelli a rischio alto con livelli di C-LDL >100 mg/dl

^(*) Per i pazienti con livello di rischio basso (score 0-1%) è indicata solamente la modifica dello stile di vita.

^(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico, è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia

^(§) Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione percutanea è indicata atorvastatina a dosaggio elevato (≥ 40 mg)

^(^) Il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la maggiore sicurezza d'uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine e gemfibrozil è invece associata ad un aumentato rischio di miopatia

- **Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo**

| DISLIPIDEMIA | Farmaci prescrivibili a carico del SSN | | |
|--|--|--|---|
| | <i>Trattamento di 1° livello</i> | <i>Trattamento di 2° livello</i> | <i>Trattamento di 3° livello</i> |
| IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE MONOGENICA (FH) | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina (**) | ezetimibe + statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**) | Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari |
| IPERLIPIDEMIA FAMILIARE COMBINATA | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina (**) | Rosuvastatina, PUFA-N3, ezetimibe + statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**) | |
| DISBETALIPROTEINEMIA | Simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina (**), fibrati | Rosuvastatina, ezetimibe + statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**) | Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari |
| IPERCHILOMICRONEMIE e gravi IPERTRIGLICERIDEMIE | Fibrati, PUFA-N3 | Fibrati in associazione a PUFA-N3 | |

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico, è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia

- **Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave**

| | <i>Farmaci prescrivibili a carico del SSN</i> |
|--|--|
| per livelli di trigliceridi \geq 500 mg/dl | PUFA-N3 |
| per livelli di LDL-C \geq 130 mg/dl | 1a scelta: simvastatina + ezetimibe 2a scelta: altre statine a minima escrezione renale |

- **Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi specificati al relativo paragrafo**

| | <i>Farmaci prescrivibili a carico del SSN</i> |
|--|---|
| Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi | Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). Fibrati nel caso sia predominante l'ipertTG. Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo. |

Nota 15 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:

- **dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica**
- **grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto post-chirurgico o da proteino-dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia**

Albumina umana

Nota 28 - La prescrizione per la terapia antitumorale e dell'AIDS a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- **neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio**
- **sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS**

Medrossiprogesterone, megestrolo

Nota 30-30 bis - Le note sono abolite e la prescrizione dei fattori di crescita granulocitaria carico del SSN è vincolata all'adozione del Piano Terapeutico AIFA redatto su specifico modulo da strutture specialistiche in una delle seguenti condizioni:

- neutropenia febbrile da chemioterapia;
- neutropenia congenita;
- trapianto di midollo osseo;
- mobilizzazione di cellule staminali periferiche;
- neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali in pazienti pluritrattati che necessitano di farmaci ad azione neutropenizzante.

La prescrizione dei fattori di crescita dei leucociti non è rimborsata dal SSN per altre indicazioni autorizzate.

Fattori di crescita dei leucociti: *filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim*

Nota 31 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:

- **tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie**

Sedativi della tosse: diidrocodeina, diidrocodeina + acido benzoico, levodropropizina

Nota 36 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

- ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (<12 nmoli/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore)

Ormoni androgeni: testosterone

Nota 39 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

Per il testo completo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-39>

Ormone della crescita (somatotropina)

Nota 41 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:

- Morbo di Paget.

Calcitonina

Nota 42 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni

- Morbo di Paget:

Acido etidronico

- trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo:

Acido clodronico

Nota 48 - La prescrizione a carico del SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento ed alle seguenti condizioni:

- **durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane):**
 - ▲ ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori* (Hp); per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione;
 - ▲ ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa (primo episodio);
 - ▲ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio);

- **durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno:**

- ▲ sindrome di Zollinger-Ellison;
- ▲ ulcera duodenale o gastrica Hp-negativa recidivante;
- ▲ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante).

Anti H2: cimetidina, famotidina, nizatidina, ranitidina, roxatidina,

Inibitori di pompa: esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo

Nota 51 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

- **carcinoma della prostata:** *buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina*
- **carcinoma della mammella:** *goserelina, leuprorelina, triptorelina*
- **endometriosi:** *goserelina, leuprorelina, triptorelina*
- **fibromi uterini non operabili:** *goserelina, leuprorelina, triptorelina*
- **trattamento intermittente (fino ad un massimo di 4 cicli) dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva:** *ulipristal acetato*
- **trattamento prechirurgico dei fibromi uterini** in donne adulte in età riproduttiva: *goserelina, leuprorelina, triptorelina*
 - durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica;
 - durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica;
- **pubertà precoce:** *leuprorelina, triptorelina*

Nota 55 - La prescrizione a carico del SSN degli antibiotici iniettabili per l'uso comunitario, è limitata alle seguenti condizioni:

- ▲ **trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari;**
- ▲ trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi.

Ceftazidima, cefepime*, mezlocillina, piperacillina, ampicillina+ sulbactam, piperacillina+ tazobactam* amikacina, gentamicina, netilmicina, tobramicina*

Un razionale utilizzo degli antibiotici permette di preservare l'ambiente territoriale extra-ospedaliero dalla diffusione delle resistenze batteriche, mantenendolo separato da quello ospedaliero ed evitando il ricorso all'ospedalizzazione per trattare infezioni risolubili efficacemente al domicilio del paziente. Tali farmaci non dovrebbero rappresentare, di norma, la prima scelta terapeutica, ma vanno riservati a casi selezionati, anche allo scopo di prevenire l'insorgere di ceppi resistenti sul territorio; ciò vale in particolare per gli antibiotici impiegati nei confronti di *Pseudomonas aeruginosa* contrassegnati da asterisco (*).

Nota 56 - (*modificata G.U. n. 150 del 30 giugno 2011*) La prescrizione a carico del SSN è limitata:

1) al trattamento iniziato in ambito ospedaliero

La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio

2) al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica

Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all'assenza di alternative terapeutiche.

La limitazione della prescrivibilità all'ambito ospedaliero o da parte del medico di medicina generale con il supporto di indagini microbiologiche è finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi.

Aztreonam, imipinem+ cilastatina, rifabutin, teicoplanina

Nota 65 - Farmaci per la sclerosi multipla:

La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN, da parte di Centri specializzati, Universitari e delle Aziende Sanitarie, secondo modalita' adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e' limitata alle seguenti condizioni:

Per i pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011):

glatiramer acetato, interferone beta-1a ricombinante, interferone beta-1b ricombinante, teriflunomide, dimetilfumarato, peginterferone beta-1a

Per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia in fase attiva evidenziata da recidive:

interferone beta-1b ricombinante.

Nota 66

La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni patologiche:

- ▲ **artropatie su base connettivica**
- ▲ **osteoartriosi in fase algica o infiammatoria**
- ▲ **dolore neoplastico**
- ▲ **attacco acuto di gotta**

aceclofenac, acetametacina, acido mefenamico, acido tiaprofenico, amtolmetina guacile, celecoxib, cinnoxicam, dexibuprofene, diclofenac, diclofenac + misoprostolo, etoricoxib, fentiazac, flurbiprofene, furprofene, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, lornoxicam, meloxicam, nabumetone, naprossene, oxaprozina, piroxicam, proglumetacina, sulindac, tenoxicam,

- ▲ **trattamento di breve durata del dolore acuto nell'ambito delle patologie sopra descritte**

nimesulide

Nota 74 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

- trattamento dell'infertilità femminile in donne di età non superiore ai 45 anni e/o con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml;

- trattamento dell'infertilità maschile in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml

- preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente.

Corfollitropina alfa, coriogonadotropina alfa, follitropina alfa, follitropina beta, menotropina, urofollitropina

Nota 75 - La prescrizione di **inibitori della PDE5** (avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil) a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica), secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.

La prescrizione di **alprostadil per iniezione intracavernosa** a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni complete del midollo spinale, e ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico qualora vi sia mancata risposta, intolleranza o contro-indicazione agli inibitori della PDE5, secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.

Farmaci per la disfunzione erettile: alprostadil, avana fil, sildenafil, tadalafil, vardenafil

Nota 79 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio di frattura osteoporotica:

- **Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche**

- **vertebrali o di femore**

| <i>Condizione</i> | <i>I scelta</i> ^a | <i>II scelta</i> | <i>III scelta</i> |
|--|---|---|--|
| 1-2 fratture ^b | Alendronato (± vit. D) Risedronato Zoledronato ^d | Denosumab ^e Ibandronato Raloxifene Bazedoxifene | Stronzio ranelato ^f |
| – ≥ 3 fratture – ≥ 1 frattura + T-score colonna o femore ^c ≤ 4 – ≥ 1 frattura + trattamento > 12 mesi con prednisone o equivalenti ≥ 5 mg/die – nuova frattura vertebrale o femorale nonostante trattamento in nota 79 da almeno un anno | Teriparatide ^g | Denosumab ^e Zoledronato ^d | Alendronato (± vit. D) Risedronato Ibandronato Stronzio ranelato ^f |

- **non vertebrali e non femorali**

| <i>Condizione</i> | <i>I scelta</i> ^a | <i>II scelta</i> | <i>III scelta</i> |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------|
| T.score colonna o femore ≤ -3 | Alendronato (± vit. D) Risedronato Zoledronato ^d | Denosumab ^e Ibandronato Raloxifene Bazedoxifene | Stronzio ranelato ^f |

- **Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥ 50 anni a rischio elevato di frattura a causa di almeno una delle condizioni sottoelencate:**

| <i>Condizione</i> | <i>I scelta</i> ^a | <i>II scelta</i> | <i>III scelta</i> |
|--|---|---|--------------------------------|
| Trattamento in atto o previsto per > 3 mesi con prednisone equivalente ≥ 5 mg/die | Alendronato (± vit. D) Risedronato Zoledronato ^d | Denosumab ^e | |
| Trattamento in corso di blocco ormonale adiuvante in donne con carcinoma mammario o uomini con carcinoma prostatico | Alendronato (± vit. D) Risedronato Zoledronato ^d Denosumab ^e | | |
| - T.score colonna o femore ^c ≤ -4 - T.score colonna o femore ^c ≤ -3 + almeno una delle seguenti condizioni: 1) Familiarità per fratture di vertebre o femore 2) Comorbilità a rischio di frattura (artrite reumatoide o altre connettiviti, diabete, broncopneumoptia cronica ostruttiva, malattia infiammatoria cronica intestinale, AIDS, Parkinson, sclerosi multipla, grave disabilità motoria) | Alendronato (± vit. D) Risedronato | Denosumab ^e Zoledronato ^d Ibandronato Raloxifene Bazedoxifene | Stronzio ranelato ^f |

^a - Il passaggio dalla prima scelta del trattamento alla successive richiede la presenza di intolleranza, incapacità di assunzione corretta, effetti collaterali o controindicazioni al farmaco della classe precedente o, nel caso del teriparatide, la fine del periodo di trattamento massimo consentito. Da valutarsi la modifica della scelta terapeutica anche in caso di frattura osteoporotica vertebrale o di femore nonostante trattamenti praticati per almeno un anno con i farmaci della classe precedente.

^b - Ai fini dell'applicazione della nota la diagnosi di frattura vertebrale si basa sul criterio di Genant (riduzione di almeno una delle altezze vertebrali di almeno il 20%).

^c - Per l'applicazione della Nota 79, la valutazione densitometrica deve essere fatta a livello di colonna lombare e/o femore con tecnica DXA presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

^d - Lo zoledronato è prescrivibile e somministrabile solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate

^e - Per il denosumab la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, rinnovabile, della durata di 12 mesi da parte di medici specialisti (internista, ortopedico, reumatologo, fisiatra, geriatra, endocrinologo, ginecologo, nefrologo), Universitari o delle Aziende Sanitarie.

^f - Per il ranelato di stronzio la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, rinnovabile, della durata di 12 mesi da parte di medici specialisti (internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo), Universitari o delle Aziende Sanitarie. Il ranelato di stronzio va riservato ai pazienti affetti da osteoporosi severa per i quali non esistano alternative terapeutiche.

⁹ - Per il teriparatide la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre tre volte (per un totale complessivo di 24 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Prima di avviare la terapia con i farmaci sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato un adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di calcio e vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). E' stato documentato inoltre che la carenza di vitamina D può vanificare in gran parte l'effetto dei farmaci per il trattamento dell'osteoporosi. La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e la eliminazione di condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi.
- La prescrizione va fatta nel rispetto delle indicazioni e delle avvertenze della scheda tecnica dei singoli farmaci.
- Non deve essere dimenticato, infine, che tutti i principi attivi non sono privi di effetti collaterali per cui va attentamente valutato il rapporto vantaggi e rischi terapeutici.

Nota 82 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- nel trattamento di "seconda linea" dell'asma moderato persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con β 2 agonisti;
- nella profilassi dell'asma da sforzo

Quando gli steroidi risultino insufficienti è preferibile, piuttosto che aumentarne il dosaggio, aggiungere un farmaco di "seconda linea". Tra questi la prima scelta è rappresentata dai β -2 agonisti a lunga durata d'azione, seguiti, come seconda scelta, dagli antileucotrieni.

Antileucotrieni: montelukast, zafirlukast

Nota 83 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- trattamento sintomatico dei pazienti affetti da malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (*sindrome secca* su base autoimmune), poiché non è disponibile una terapia di tipo causale della malattia.

La terapia della malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome secca in corso di patologia autoimmune) è attualmente solo sintomatica ed è diretta alla riduzione delle manifestazioni di insufficienza esocrina. La correzione della secchezza oculare può essere effettuata con sostanze di natura diversa, per le quali esista una dimostrazione clinica di efficacia.

Carbomer

Nota 84 - La prescrizione a carico del SSN in soggetti immunocompetenti è limitata alle seguenti condizioni:

Virus Herpes Simplex:

- trattamento delle infezioni genitali acute
aciclovir, famciclovir, valaciclovir
- profilassi e trattamento delle recidive a localizzazione genitale
aciclovir, famciclovir, valaciclovir
- cheratite erpetica
aciclovir
- trattamento della stomatite in età pediatrica
aciclovir

Virus Varicella-Zoster:

- trattamento della varicella:
aciclovir
- trattamento delle infezioni cutanee :
aciclovir, famciclovir, valaciclovir, brivudin

La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.

Nota 85 - La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata a:

pazienti con malattia di Alzheimer

- di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 (*donepezil, rivastigmina, galantamina*)
- di grado moderato con MMSE tra 10 e 20 (*donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina*).

Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla scala MMSE.

Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato.

La risposta clinica dovrà essere monitorata ad intervalli regolari dall'inizio della terapia:

- *a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l'aggiustamento del piano terapeutico;*
- *a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i tre mesi deve basarsi sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE ed esame clinico;*
- *ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità.*

Nota 87 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:

- *pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla).*

Antispastici urinari: ossibutinina

Nota 88 - La prescrizione a carico del SSN, **su diagnosi di specialisti**, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alla seguente condizione:

- **pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche** (ad es. psoriasi, dermatite atopica).

Cortisonici per uso topico

Nota 89 - La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione:

- **pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave** (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) **per trattamenti prolungati** (superiori ai 60 giorni).

Antistaminici: acrivastatina, cetirizina, desloratadina, ebastina, fexofenadina, ketotifene, levocetirizina, loratadina, mizolastina, oxatomide, prometazina

Nota 90 - La prescrizione a carico del SSN e' limitata alle seguenti condizioni :

- *costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondono contemporaneamente alle seguenti caratteristiche :*
 - *terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno di due settimane*
 - *resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di tre giorni*

Metilnaltrexone Bromuro

Nota 91 - La prescrizione a carico del SSN e' limitata alle seguenti condizioni :

- *trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo (fino ad 800 mg/die in 2-3 sommi. dopo i pasti) o siano ad esso intolleranti*

Febuxostat

Nota 92 - La prescrizione e la dispensazione a carico del SSN, da parte di centri specializzati, Universitari e delle aziende sanitarie, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

1. *Profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle recidive della malattia reumatica*
2. *Sifilide.*

Benzilpenicillina benzatinica

Nota 93 - La prescrizione a carico del SSN e' limitata alle seguenti condizioni :

- *Trattamento acuto delle crisi nelle epilessie dell'età pediatrica con elevato rischio di occorrenza di crisi prolungate (durata maggiore di 5 minuti) o di stato di male epilettico*

Forme idiopatiche

- Sindrome di Dravet
- Sindrome di Panayiotopoulos

- Trattamento acuto delle crisi nelle altre epilessie dell'età pediatrica, dopo un precedente episodio di crisi prolungata (durata maggiore di 5 minuti) o di stato di male epilettico
 - Forme idiopatiche
 - Forme sintomatiche a varia eziologia

Midazolam oromucosale

Nota 94 - La prescrizione di N3 PUFA (acidi grassi omega 3 con contenuto di EPA+DHA easteri etilici 85% minimo pari a 850 mg/g) è a carico del SSN solo se rispondente a una delle seguenti condizioni:

- **Ricovero per sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST** (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE)

- **Sofferta sindrome coronarica acuta con o senza innalzamento del tratto ST** (sindrome coronarica acuta SCA-STE, sindrome coronarica acuta SCA-NSTE) **nei precedenti 90 giorni**

SCA-STE=sindrome coronarica acuta con sopraslivellamento del tratto ST;

SCA-NSTE= sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST

Nei pazienti con SCA-STE è necessaria la presenza di:

- sopraslivellamento del tratto ST di almeno 0.1 mV in almeno due derivazioni contigue o blocco di branca sinistra di recente (<24 ore) insorgenza

- alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico

Nei pazienti con SCA-NSTE è necessaria la presenza di:

- alterazioni di biomarcatori indicativi di danno miocardico

La **durata del ciclo di trattamento rimborsabile** è di:

- 12 mesi nei pazienti con frazione di eiezione alla dimissione ospedaliera >40%

- 18 mesi nei pazienti con frazione di eiezione <40% alla dimissione ospedaliera.

Acidi grassi omega 3

Nota 95- La prescrizione a carico dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero > 6.

Farmaci per la cheratosi attinica: diclofenac 3% in ialuronato di sodio

Farmaci per la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: imiquimod crema 3,75%, ingenolo mebutato gel

Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto:

*Diclofenac 3% in ialuronato di sodio#, Imiquimod 3,75%, Ingenolo mebutato**

Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità:

*Diclofenac 3% in ialuronato di sodio#, Ingenolo mebutato**

non devono essere applicati più di 8 g al giorno

** ogni singolo trattamento può interessare al massimo 2 superfici non contigue ognuna di dimensioni fino a 25 cm²*

La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. Non sono attualmente disponibili confronti diretti tra i trattamenti farmacologici topici che consentano di definire la superiorità di un farmaco rispetto all'altro; la scelta del trattamento dovrà considerare le caratteristiche dei pazienti in rapporto ai criteri di reclutamento degli studi clinici, i dati di sicurezza disponibili, le criticità e i tempi della somministrazione in termini di modalità di utilizzo e in rapporto all'obiettivo clinico.

I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.

R.A.O. - RAGGRUPPAMENTI DI ATTESA OMOGENEI

In ossequio alla normativa nazionale ed all'accordo Stato-Regioni per il governo delle liste d'attesa, la Regione Umbria ha individuato con la DGR n. 48 del 24 gennaio 2011 una serie di prestazioni da inserire nei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (R.A.O.).

Si tratta di una **prima visita** o un **primo esame** che, a seconda della motivazione, va inserita nell'appropriata classe di priorità:

Urgente : accesso in Pronto Soccorso

Priorità **U** (Urgente differibile) attesa massima 3 giorni

Priorità **B** (Breve) attesa massima 10 giorni

Priorità **D** (Differita) attesa massima 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli accertamenti

Priorità **P** (Programmata) attesa massima 180 giorni

Le prestazioni individuate dalla ex ASL 4 con due documenti del luglio 2011 e novembre 2012, sono:

- visita cardiologica con ECG (*revisionata nov. 2012*)
- visita chirurgica e visita di chirurgia vascolare
- visita dermatologica
- visita fisiatrica
- visita gastroenterologica
- visita oculistica
- visita ortopedica
- visita otorino
- visita urologica
- visita neurologica
- ECG Holter e da sforzo
- ecocolordoppler (tronchi sovra-aortici, arti, arterie renali)
- ecocolordoppler cardiaco
- ecografia addome superiore e inferiore
- eco osteoarticolare/muscolotendinea
- elettromiografia
- esami di diagnostica per immagini mammografia
- esofagogastroduodenoscopia e colonscopia (*revisionata nov. 2012*)
- RMN cranioencefalica, della colonna e delle articolazioni
- Rx torace
- TAC cranioencefalica e della colonna

Nella richiesta di prestazione si deve:

- riportare la dizione **primo esame** o **prima visita** (non rientrano nella fattispecie i controlli successivi effettuati per la stessa patologia, per i quali va contrassegnata la casella "altro" nella ricetta)
- trascrivere il quesito diagnostico utilizzando le **parole chiave** contenute nel documento regionale
- barrare la casella indicante la **classe di priorità**

Per visionare l'elenco completo con la corrispondenza motivazione-classe di priorità:

<http://www.ordinemediciterni.it/utility/vademecum-professionali>



Si riporta a titolo di esempio dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei:

| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA + ECG | | |
|--|-----------------------------|--|
| CLASSE DI PRIORITA' | ATTESA MASSIMA DA GARANTIRE | SITUAZIONI CLINICHE |
| | INVIARE IN PS | <ul style="list-style-type: none"> - Dolore toracico di sospetta origine cardiaca - Insufficienza cardiaca acuta - Sincope (improvvisa perdita di conoscenza e caduta a terra) - Cardiopalmo persistente/parossistico in atto o di recente insorgenza \leq 2gg, con polso ritmico/aritmico - Bradicardia marcata sintomatica, freq. $<$ 50 b/min - Soffio cardiaco associato a cianosi nel neonato |
| CLASSE <U> | 3 gg | <ul style="list-style-type: none"> - Segni o sintomi suggestivi di Insufficienza cardiaca cronica riacutizzata nonostante l'ottimizzazione della terapia - Dispnea, palpitazione o affaticamento per sforzi lievi, verosimilmente di natura cardiaca con caratteristiche di recente insorgenza in soggetti senza precedente diagnosi di cardiopatia - Cardiopalmo persistente/parossistico di durata \geq 3 gg, ritmico/aritmico, |
| CLASSE | 10 gg | <ul style="list-style-type: none"> - Episodi di dolore toracico presente da $>$ 30 gg con caratteristiche cliniche di stabilità - Soffio cardiaco nel neonato: primo riscontro in assenza di sintomi - Bradicardia $<$ 50 b/min. di nuova insorgenza, asintomatica |
| CLASSE <D> | 30 gg | <ul style="list-style-type: none"> - Dispnea, palpitazione o affaticamento persistenti per sforzi moderati o intensi - Soffi cardiaci (escluso il neonato) di primo riscontro in assenza di sintomi - Episodi di cardiopalmo, frequenti e di breve durata ovvero rilevazione di disturbi del ritmo all'esame clinico - Valutazioni suggerite da strutture ospedaliere solo nel caso che non siano attive agende interne - Valutazioni richieste dalle Commissioni Invalidi Civili |
| CLASSE <P> | 180 gg | <ul style="list-style-type: none"> - Familiarità per cardiopatie ereditarie - Attività sportiva non agonistica - Connettivopatie, Endocrinopatie - Presenza e controllo di fattori di rischio cardiovascolare (specificare: ipertensione arteriosa sistemica, diabete mellito, ecc. ...) |

PRIMO ESAME ECOCOLORDOPPLER VASI PERIFERICI ARTERIOSI E VENOSI

| CLASSE DI PRIORITA' | ATTESA MASSIMA DA GARANTIRE | SITUAZIONI CLINICHE | |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | Eco doppler arterioso | Eco doppler venoso |
| | INVIARE IN PS | <ul style="list-style-type: none"> Ischemia acuta - Ischemia critica - Aneurisma sintomatico - Microembolia periferica ("dito blu") | Alta probabilità di TVP (Score di Wells $>$ 3) in presenza di edema omolaterale del polpaccio $>$ 3 cm rispetto all'arto controlaterale |
| CLASSE <U> | 3 gg | <i>Livello di priorità non previsto</i> | Sospetta TVP (Score di Wells 2-3) |
| CLASSE | 10 gg | Improvvisa riduzione dell'autonomia di marcia in assenza di polsi tibiali palpabili | Flebite superficiale di coscia |
| CLASSE <D> | 60 gg | Arteriopatia periferica obliterante, inquadramento diagnostico-terapeutico | Sindrome post- flebitica |
| CLASSE <P> | 180 gg | <i>Livello di priorità non previsto</i> | Altre condizioni che richiedono ulteriore approfondimento diagnostico |

| SCORE DI WELLS per il sospetto clinico di TVP (JAMA 1998; 279: 1094-9) | |
|---|-------------------------------|
| Parametro clinico | Punteggio |
| Cancro in atto (terapia in corso o negli ultimi 6 mesi o palliativo) | 1 |
| Recente allettamento per più di 3 giorni o chirurgia maggiore nelle ultime 4 settimane | 1 |
| Paralisi, paresi o recente immobilizzazione di un arto inferiore | 1 |
| Tensione dolorosa lungo la distribuzione del sistema venoso profondo | 1 |
| Gonfiore a tutta la gamba | 1 |
| Edema del polpaccio > 3 cm in confronto alla gamba asintomatica (misurato 10 cm sotto la tuberosità tibiale); <i>in pazienti con sintomi bilaterali usare la gamba peggiore</i> | 1 |
| Edema con fovea (maggiore nella gamba sintomatica) | 1 |
| Vene superficiali collaterali (non varicose) | 1 |
| Diagnosi alternativa più verosimile o più probabile | -2 |
| Interpretazione | |
| Punteggio totale ≥ 3 : | alta probabilità di TVP |
| Punteggio totale tra 1 e 2: | probabilità intermedia di TVP |
| Punteggio totale ≤ 0 : | bassa probabilità di TVP |

Sintomi compatibili con la diagnosi di arteriopatia cronica ostruttiva (*Questionario di Rose*)

1. Quando cammina accusa dolore o altro disturbo alla/e gamba/e?
2. Il dolore inizia a volte quando è in piedi o seduto?
3. Avverte questo dolore al/ai polpaccio/polpacci?
4. Lo accusa quando cammina in salita o a passo svelto?
5. Lo accusa quando cammina a passo normale?
6. Il dolore a volte scompare quando sta camminando?
7. Cosa fa se il dolore continua mentre sta camminando? Si ferma o rallenta oppure continua?
8. Cosa succede se si ferma? Il dolore scompare in 10 minuti o meno oppure dura più di 10 minuti?

Claudicatio intermittens se: risposta SI alle domande 1-3-4-5, risposta NO alle domande 2-6, “si ferma o rallenta” alla domanda 7, “scompare in meno di 10 minuti” alla domanda 8

